

RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DEL ALMENDRO EN ZONAS FRIAS

José Egea y Federico Dicenta

Departamento de Mejora Vegetal. CEBAS-CSIC, Murcia

ERRADICAR AL MÁXIMO LAS VARIEDADES DE FLORACIÓN TEMPRANA:

- Reinjertar las plantaciones tradicionales, con variedades de floración tardía.
- Evitar nuevas plantaciones con variedades tempranas (Marcona, Desmayo Largueta, Fernanda, etc.)

GENERALIZAR EL USO DE VARIEDADES AUTO-COMPATIBLES:

- Evitar las variedades auto-incompatibles, tales como Ferragnès, Ferraduel, etc.
- Acelerar el conocimiento de las nuevas variedades tardías auto-compatibles (Antoñeta, Guara, Marinada, Vayro, Soleta, etc.).
- Identificar las áreas con riesgo de frío extremo para aconsejar en ellas el empleo de variedades extra-tardías auto-compatibles, como Penta.

CUIDAR AL MÁXIMO LA POLINIZACIÓN:

- Cuando se cultiven variedades auto-incompatibles, como Ferragnès, comprobar que tenemos al menos el 30% de árboles de la variedad polinizadora y suficientes colmenas (al menos 6 por ha). En caso contrario, reinjertar un 30% con una variedad auto-compatible que florezca al mismo tiempo.
- Introducir colmenas siempre que se pueda, aunque se trate de una variedad auto-compatible y evitar los tratamientos fitosanitarios durante la floración.

PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN AL APROVECHAMIENTO DEL AGUA:

- Desfondar la parcela antes de la plantación. Alternativamente, hacer grandes hoyos con retroexcavadora.
- Evitar la evaporación trabajando el suelo adecuadamente y evitar las malas hierbas.
- Aumentar la superficie regada cuando sea posible. A más riego, más rentabilidad.
- No reducir los marcos de plantación por debajo de 7 m.

CUIDAR EL ESTADO SANITARIO DEL ÁRBOL:

- Evitar el empleo de variedades muy susceptibles a enfermedades criptogámicas.
- Realizar los tratamientos fitosanitarios adecuados.

CULTIVAR VARIEDADES DE FLORACION TARDIA, AUTO-COMPATIBLES Y DE MADURACION TEMPRANA

¡Y PONER COLMENAS!